



Эта теория предложена Б. П. Алисовым. Классификация отличается от ландшафтно-ботанической, в частности, тем, что охватывает не только сушу, но и океаны. В соответствии с ней климатические зоны выделяются соответственно особенностям общей циркуляции атмосферы. Выделяются семь основных и шесть переходных зон.

Эта теория предложена Б. П. Алисовым. Классификация отличается от ландшафтно-ботанической, в частности, тем, что охватывает не только сушу, но и океаны. В соответствии с ней климатические зоны выделяются соответственно особенностям общей циркуляции атмосферы. Выделяются семь основных и шесть переходных зон.

В основных зонах климат образуется круглогодично под влиянием только одного типа воздушных масс: арктического, умеренного, тропического (всех этих зон существует по две на каждое полушарие) и экваториального типов.

Между основными зонами расположены переходные – три в северном и три в южном полушарии. Они характеризуются сезонной сменой преобладающих воздушных масс. Это области тропических муссонов, субтропические и суб(ант)арктические зоны. В зависимости от времени года они находятся под влиянием воздуха то более низких, то более высоких широт.

В каждой из зон может присутствовать до четырех типов климата: морской, континентальный типы и климат западных или восточных берегов.

Автор: Administrator

03.09.2010 09:05 - Обновлено 07.09.2010 11:16

---